

## **PŘÍBALOVÁ INFORMACE – VP**

**Informace pro použití, čtěte pozorně!**

### **FAMOSAN 10 mg**

(Famotidinum)

potahované tablety

### **DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI/VÝROBCE**

PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4, Česká republika

### **SLOŽENÍ**

léčivá látka: famotidinum 10 mg v 1 potahované tabletě

pomocné látky: mikrokrytalická celulóza, laktosa, kukuřičný škrob, stearan hořečnatý, koloidní oxid křemičitý, hypromelosa, makrogol, oxid titaničitý, červený a žlutý oxid železitý, emulze dimetikonu

### **INDIKAČNÍ SKUPINA**

Antiulcerózum, antagonist histaminových H<sub>2</sub>-receptorů

### **CHARAKTERISTIKA**

Famosan 10 mg patří do skupiny léků, které snižují tvorbu kyselé žaludeční šťávy. Rychle se vstřebává ve střevě a jeho účinek není ovlivněn současnou náplní žaludku. Po podání jedné tablety nastupuje účinek během půl hodiny a trvá po dobu 9 hodin.

Při nedostatečnosti ledvin dochází k významnému prodloužení jeho účinku.

### **INDIKACE**

Přípravek se užívá ke zmírnění příznaků pálení žáhy, žaludečního překyselení a žaludeční nevolnosti. Přípravek mohou používat dospělí od 18 let. Mladiství od 16 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

### **KONTRAINDIKACE**

Famosan 10 mg se nesmí užívat při precitlivělosti na jeho složky a při zhoubné povaze vředové choroby. Pro užívání přípravku v těhotenství a v období kojení musí být zvlášť závažné důvody; v tomto případě je možno přípravek užívat pouze se svolením lékaře. Při otěhotnění během léčby je třeba ihned uvědomit ošetřujícího lékaře. Pacientům mladším než 16 let se tento přípravek nepodává.

## **NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Přípravek Famosan 10 mg je obvykle dobře snášen. Četnost je u různých nežádoucích účinků rozdílná. Mohou se vyskytnout bolesti hlavy, závratě, sucho v ústech, nevolnost, nadýmání, zácpa, průjem, nechutenství. Ve výjimečných případech se mohou objevit křeče, menstruační poruchy a vypadávání vlasů.

Laboratorně byl vzácně zjištěn vzestup jaterních enzymů a změny v krevním obraze.

Vznik nežádoucích účinků během léčby ohlaste svému lékaři.

Při výskytu přecitlivělosti na Famosan 10 mg, která se projevuje např. kožními vyrážkami nebo trávicími poruchami, je třeba léčbu přerušit a nahlásit ošetřujícímu lékaři.

## **INTERAKCE**

Klinicky významné interakce přípravku Famosan 10 mg s jinými léky nejsou známe.

## **DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ**

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělí obvykle užívají 1 tabletu při obtížích. Tato dávka by měla přinést úlevu na dobu asi 9 hodin. V průběhu 24 hodin lze užít dvě tablety. Celková doba léčby bez vědomí lékaře by neměla přesáhnout 5 dní. Mladistvým od 16 let dávku určí lékař. Pacientům mladším než 16 let se tento přípravek nepodává.

## **UPOZORNĚNÍ**

Pacienti s diagnózou vředové choroby, s těžkou poruchou ledvin, pacienti středního nebo vyššího věku, u kterých došlo v souvislosti se zažívacími potížemi (dyspeptický syndrom) k váhovému úbytku, obtížemi při polykání, současně užívající jiné léčivé přípravky, se o vhodnosti užívání tohoto přípravku musí poradit s lékařem. Bez porady s lékařem užívejte Famosan 10 mg nejdéle po dobu 5 dní. Jestliže příznaky neustoupí nebo se vyskytnou nežádoucí účinky nebo neobvyklé reakce, navštivte lékaře.

## **UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

## **VAROVÁNÍ**

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

## **BALENÍ**

10 potahovaných tablet

## **DATUM POSLEDNÍ REVIZE**

27.1.2010